

# 家畜衛生だより


令和3年11月

山形県中央家畜保健衛生所  
村山地域家畜畜産物衛生指導協会  
〒990-2161 山形市漆山 736 番地  
Tel 023-686-4410  
Fax 023-686-5715

## 鹿児島県で 高病原性鳥インフルエンザの 疑似患畜確認（国内3例目）

- 1 発生日 11月15日（月）
- 2 発生農場 出水市の採卵養鶏農場
- 3 飼養羽数 約1万1千羽
- 4 経過

- (1) 11月14日、国内2例目から3km圏内（移動制限区域内）の農場で死亡鶏が確認され、同日実施した簡易検査で陽性。
- (2) 11月15日、遺伝子検査で高病原性鳥インフルエンザと確認。



★県内に飛来する渡り鳥も日に日に増えております！★  
**鳥インフルエンザ対策の再徹底を！！**

**ウイルスの侵入を防ぎましょう！**

- 飼養衛生管理基準の遵守
- 飼養家さんの異状の**早期発見・通報**
- 畜舎に出入りする際の**手指及び靴の消毒**、**衣服の交換**
- 農場に出入りする**車両の消毒**
- **野鳥・野生動物の侵入防止対策**の点検



## 【高病原性及び低病原性鳥インフルエンザの特定症状】

- ① 同一舎内で、1日の死亡数が過去21日間の平均死亡率の2倍以上（※ 設備の故障、気温の急変等の場合を除く）
- ② 鶏冠・肉垂等のチアノーゼ、沈うつ、産卵率の低減等を呈す
- ③ 5羽以上がまとまって死亡、あるいは、うずくまっている

### 1. ウイルスの侵入防止

- ① 野鳥・野生動物の侵入防止 隙間を金網やネット等で塞ぐ
- ② 靴底に付着しての搬入を防止 踏み込み消毒槽の設置
- ③ 衛生管理区域や鶏舎に出入りする際の衣服・長靴の交換及び手指の消毒

### 2. 踏み込み消毒槽の設置



- 靴底が浸る程度に消毒液をいれる。
  - 底にぞうきん等を敷いてもよい。
  - 消毒薬は毎日交換する（汚れると効果は著しく低下）。
- 〈使用する消毒薬〉  
逆性石けん（例：クリアキル、パコマなど）  
希釈率 200 倍程度（水 1 L にキャップ 1 杯程度）

鳥インフルエンザウイルスの消毒には、扱い易い逆性石鹼が便利！

### 3. 鶏舎周囲に消石灰散布

1 m<sup>2</sup>あたり 400 g 程度を粉剤のまま散布（目安）

異常が認められる場合は、速やかに家畜保健衛生所まで連絡してください！

中央家畜保健衛生所 023-686-4410（休日・夜間共通）