











麻薬一覧

オピオイド	投与経路		商品名	剤形	規格	薬価(円)	外観
モルヒネ	経口	速放性	<u>塩酸モルヒネ</u>	散剤	適宜	2310.3/g	
			<u>塩酸モルヒネ</u>	錠剤	10mg	128.4	
			<u>オプソ</u> ・水なしで内服可	液剤	5mg/2.5ml, 10mg/5ml	126.6 235.1	
		徐放性(12 時間)	<u>MS コンチン</u>	錠剤	10mg 30mg 60mg	258.8 757.1 1413.9	
	徐放性(24 時間)	<u>カディアンスティック</u> ・経管栄養チューブから投与可	顆粒剤	30mg 60mg 120mg	810.6 1529.1 2721.4		
	経直腸	速放性	<u>アンベック</u>	坐剤	10mg 20mg 30mg	331.9 628.3 908.2	

モルヒネ	注射		<u>塩酸モルヒネ</u>	注射剤	10mg/1ml, 50mg/5ml 200mg/5ml	321 1452 5292	
オキシドロン ・腎機能障害による影響を受けにくい	経口	速放性	<u>オキノーム散</u> <u>0.5%</u>	散剤	2.5mg/0.5g1包 5mg/1g1包	66.30 132.60	
		徐放性(12時間)	<u>オキシコンチン</u>	錠剤	5mg 10mg 20mg 40mg	151.3 282.1 530.3 978.3	
フェンタニル ・副作用(嘔気・嘔吐、便秘など)の副作用の頻度が低い ・腎障害を持つ患者にも使用できる	経皮	徐放性(72時間)	<u>デュロテップパッチMT</u> ・3日ごとに貼りかえる	貼付剤	2.1mg 4.2mg 8.4mg 12.6mg 16.8mg	1926.20 3467.20 6538.90 9356.60 12047.70	
	注射		<u>フェンタニル</u>	注射剤	0.1mg/ml 0.25mg/ml	357 858	