

報道関係者各位

つつが虫病（四類感染症）の発生について

米沢市の医療機関から置賜保健所に対し、つつが虫病発生の届出がありました。
気温も高くなり、薄着で山でのレジャーや田畑での作業をする機会が多くなりました。
つつが虫病の感染を予防するため、注意喚起に御協力くださるようお願いいたします。

1 今回発症事例の概要

患者	米沢市在住、80代、女性
発病日	平成30年5月20日（日）
届出受理日	平成30年6月12日（火）
主な症状	発熱（41℃）、発疹、刺し口
患者の経過	・平成30年5月23日（水）医療機関受診、入院 ・平成30年6月1日（金）つつが虫病を疑い、検査機関へ検査を依頼。 ・平成30年6月11日（月）血液検査の結果、つつが虫病と確定。 患者は入院中だが、快方に向かっている。 ※ 患者は、米沢市郊外の山中で山菜採りを行っていた。

2 つつが虫病について

- ・ツツガムシ（ダニの一種）の幼虫に刺されて感染し、潜伏期間は5～14日
- ・38～40℃の高熱、全身倦怠感、寒気、頭痛などの風邪様症状が伴う。発熱後2～5日後にほぼ全身にわたって赤い発疹が現れ、刺された部位（刺し口）の近くのリンパ節が腫れる。
- ・季節的には春から初夏にかけて最も多く発生するが、秋にも発生がみられる。

県民のみなさまへ

山や田畑で作業をする際には、下記のことにご注意願います。

（1）ダニは田畑、山林、やぶ、河川敷などに生息しています。農作業、山菜採り、レジャーなどで、このような場所に立ち入る時には次のようなことに御注意ください。

- ①長袖、長ズボン、長靴、手袋等を着用し、素肌を出来るだけ露出しない。
- ②休息する時には、なるべく草むらに直接座らない。
- ③ダニ忌避剤、防虫剤を衣服に散布する。
- ④帰宅したら早めに風呂に入ってダニを洗い流す。また、衣服の洗濯を行う。

（2）治療が遅れると重篤になる場合があります。ツツガムシの生息していそうな場所に立ち入ってから5～14日後に上記の症状が出た場合は、早期に医療機関を受診し、それらの場所に立ち入ったことを医師に話すことが大切です。

<参考>つつが虫病の発生状況

（単位：人）

年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年
県内患者数	3	8	5	6	7
全国の患者数	320	422	505	417	70(5/27現在)

問合せ先 山形県健康福祉部健康福祉企画課
薬務・感染症対策室 室長補佐 神棒 正弘 023-630-2292
報道監 健康福祉部次長 荒木 歩