

家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所
最上地域家畜畜産物衛生指導協会
令和4年11月4日発行

今シーズン国内 4、5 例目

茨城県と岡山県で 高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認！

令和4年11月4日に、茨城県かすみがうら市と岡山県倉敷市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の疑似患畜が確認されました。概要は以下のとおりです。

① 農場所在地：茨城県かすみがうら市 飼養状況：採卵鶏 約 100 万羽

- ・ 令和4年11月3日、かすみがうら市の農場から死亡羽数が増加している旨の通報を受け農場への立入検査を実施。鳥インフルエンザの簡易検査を実施し、陽性であることが判明。
- ・ 令和4年11月4日、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

② 農場所在地：岡山県倉敷市 飼養状況：採卵鶏 約 51 万羽

- ・ 令和4年11月3日、倉敷市の農場から死亡羽数が増加している旨の通報を受け、農場への立入検査を実施。鳥インフルエンザの簡易検査を実施し、陽性であることが判明。
- ・ 令和4年11月4日、遺伝子検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認

R4.11.4時点

発生都道府県 殺処分羽数

1道3県

189万羽

● : これまでに確認された地点
☆ : 今回確認された地点

家きんでの HPAI 発生が続いています！

飼養衛生管理基準を順守し、ウイルス侵入
防止対策の徹底をお願いします!!



以下の点を再度確認しましょう！

予防対策の重要ポイント



① 人・物・車両によるウイルスの持ち込み防止

- ・ 衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
- ・ 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
- ・ 上記措置の記録

② 野生動物対策

- ・ 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕
- ・ 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・ 上記措置の定期点検

飼養鶏に異常を認めた場合は、直ちに家畜保健衛生所にご連絡ください。

○農場での人や車両の出入の際の消毒等の徹底

○野生動物（野鳥など）の農場への侵入防止対策の徹底

○飼養家きんを毎日観察し、万が一、飼養家きんに異常を発見した場合は、すぐに担当獣医師もしくは当所までご連絡ください

最上家畜保健衛生所 電話:0233-29-1357