

七福久

しちふくひさ

山形県産種雄牛

MUFA育種価「H」ランク!

第13回全国和牛能力共進会

第7区(脂肪の質評価群)種雄牛

Y黒78

登録番号: 黒原6392(84.1)
生年月日: 令和元年7月17日
繁殖者: 山形県金山町 今村 彦也
繋養場所: 山形県農業総合研究センター
畜産研究所

遺伝性疾患: なし
遺伝的不良形質: なし
直接検定: DG=1.21

☆血統

美津照重

黒高2050(83.3)
[宮崎・小林]

美津照 — 美津福 — 谷福土井
[鳥取・東伯] [兵庫・美方] [兵庫・美方]

いつみ — 美津福 — 谷福土井
[宮崎・小林] [兵庫・美方] [兵庫・美方]

ふくひさの2

黒高224414(81.5)
[山形・最上]

勝忠平 — 平茂勝 — 第20平茂
[鹿児島・薩摩] [鹿児島・薩摩] [鳥取・八頭]

ふくひさ — 安福久 — 安福165の9
[山形・最上] [栃木・那須] [岐阜・高山]

本牛は、脂肪交雑の推定育種価並びにMUFAのゲノミック育種価が優秀な繁殖雌牛「ふくひさの2」と、全国的に産肉能力の評価が高い但馬系種雄牛「美津照重」との交配により作出されました。

父「美津照重」と母「ふくひさの2」の優れた脂肪交雑能力を受け継ぎ、現場後代検定成績では、本県歴代種雄牛最高成績のBMSNo.10.1、上物率100%を記録しました。

また、脂肪の質(MUFA)の推定育種価も「H」ランクと優れた能力をもっている種雄牛です。

現場後代検定成績(平均値)

性別	頭数	出荷月齢(月)	枝肉重量(kg)	ロース芯面積(cm ²)	バラの厚さ(cm)	皮下脂肪の厚さ(cm)	推定歩留(%)	脂肪交雑(BMS No)	4・5等級率(%)
去勢	10	30.1	470	56.7	8.7	2.0	74.9	9.9	100
メス	9	31.1	426	62.8	8.6	3.2	75.0	10.3	100
全体	19	30.6	449	59.6	8.6	2.6	75.0	10.1	100



・性別: 去勢 ・母の父: 諒太郎 ・母の祖父: 福安照 ・枝重: 478kg ・ロース: 71cm² ・BMS: 12

・性別: めす ・母の父: 福之姫 ・母の祖父: 安福久 ・枝重: 407kg ・ロース: 87cm² ・BMS: 12

問合せ先 山形県農林水産部畜産振興課 TEL 023-630-3351

山形県農業総合研究センター畜産研究所 TEL 0233-23-8811

凍結精液取扱窓口 山形県家畜改良協会 TEL 023-665-1159 FAX 023-665-1154

現場後代検定成績 一覧

七福久

しちふくひさ

登録番号 黒原 6392 (84.1)
 生年月日 令和元年 7月 17日
 繁殖者 山形県金山町 今村 彦也
 繋養場所 山形県農業総合研究センター
 畜産研究所

No.	性別	母の父	母の祖父	出荷 月齢 (月)	枝肉 重量 (kg)	ロース芯 面積 (cm ²)	バラ 厚さ (cm)	皮下脂肪 の厚さ (cm)	推定 歩留 (%)	脂肪 交雑 (BMSNo.)	格付 等級
1	去勢	景勝 21	第 1 花国	30.2	483	48	8.9	1.9	73.9	6	A4
2	去勢	隆之国	平忠勝	30.0	502	53	9.0	2.9	73.5	9	A5
3	去勢	満開 1	北国 7 の 8	30.0	467	56	9.0	2.6	74.5	12	A5
4	去勢	花国安福	満開 1	30.0	427	53	7.6	1.9	74.3	9	A5
5	去勢	平忠勝	北国 7 の 8	29.7	391	54	6.8	1.4	74.8	10	A5
6	去勢	諒太郎	福安照	30.5	478	71	10.0	1.6	77.9	12	A5
7	去勢	美津照重	平茂勝	30.2	459	60	8.5	1.4	75.9	12	A5
8	去勢	北景茂	勝忠平	30.1	469	57	8.2	2.5	74.2	9	A5
9	去勢	満開 1	平茂勝	29.8	549	66	10.7	2.4	76.1	11	A5
10	去勢	美津照重	北国 7 の 8	30.2	478	49	8.6	1.8	73.9	9	A5
11	雌	第 1 花国	安秀 1 6 5	32.0	448	61	9.1	3.5	74.6	11	A5
12	雌	茂福久	美穂国	32.0	423	58	6.7	3.8	72.7	10	A5
13	雌	耕富士	美穂国	32.0	505	57	10.7	5.6	72.5	10	A5
14	雌	福之姫	安福久	30.3	407	87	8.4	2.3	79.2	12	A5
15	雌	勝洋	安福久	30.7	442	62	8.6	3.3	74.7	12	A5
16	雌	花美千	美津照	30.3	421	59	8.1	3.3	74.3	12	A5
17	雌	安福久	福桜	30.2	370	53	6.9	1.4	75.0	7	A4
18	雌	平忠勝	紋次郎	30.1	324	48	8.0	1.9	75.2	8	A5
19	雌	安茂勝	福栄	32.2	492	80	10.5	4.1	76.9	11	A5

産子の脂肪酸組成(%)	オレイン酸		MUFA	
	去勢	雌	去勢	雌
七福久	55.7	58.0	63.4	66.6
過去 4.6 万頭の平均	54.0	54.8	63.2	64.8

推定育種価

枝肉重量	ロース芯面積	バラ厚	皮下脂肪	推定歩留	脂肪交雑	オレイン酸	MUFA
C	C	B	B	C	H	H	H

※枝肉6形質は令和7年8月評価、脂肪酸組成は令和7年5月評価です。
 ※「H」は、上位1/10以内を示します。