

# 家畜衛生だより

最上家畜保健衛生所  
最上地域家畜畜産物衛生指導協会  
令和8年1月発行

## 国内 15~16 例目の高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)疑似患畜確認！(香川県、三重県)

### < 発生状況 >

15例目: 1/10 香川県東かがわ市 採卵鶏 約 2.4万羽

16例目: 1/13 三重県津市 採卵鶏 約 2.5万羽

R 7年シーズン 殺処分対象 約 410万羽

No.	県名	市町村	発生	羽数(万羽)
1	北海道	白老町	R7.10.22	採卵鶏 45.9
2	北海道	恵庭市	R7.11.2	採卵鶏 23.6
3	新潟県	胎内市	R7.11.4	採卵鶏 63.0
4	新潟県	胎内市	R7.11.9	採卵鶏 28.0
5	宮崎県	日向市	R7.11.22	肉用鶏 4.8
6	鳥取県	米子市	R7.12.2	肉用鶏 7.5
7	兵庫県	姫路市	R7.12.16	採卵鶏 24.0
8	岡山県	津山市	R7.12.20	採卵鶏 43.0
9	京都府	亀岡市	R7.12.24	採卵鶏 28.0
10	茨城県	城里町	R7.12.25	採卵鶏 97.0
11	北海道	由仁町	R7.12.29	採卵鶏 0.6
12	埼玉県	嵐山町	R7.12.30	採卵鶏 24.0
13	宮崎県	延岡市	R8.1.2	肉用種鶏 0.6
14	兵庫県	姫路市	R8.1.8	採卵鶏 15.5
15	香川県	東かがわ市	R8.1.10	採卵鶏 2.4
16	三重県	津市	R8.1.13	採卵鶏 2.5



### 今シーズンの月毎発生数



- 12月以降、発生が増加傾向にあり、全国どこでも発生するおそれがあります。
- 日常の衛生管理対策をしっかりと実施し、本病ウイルスの侵入を防止してください。